

Norat G

První pomoc:

Při náhodném požití:

vypít 0,5 litru vlažné vody s 10 tabletami medicijního uhlí a drážděním hrdla vyvolat zvracení, nejdéle do 10 minut od požití.

Při zasažení očí prachem:

vymývat 5-10 minut proudem čisté vody.

Při zasažení pokožky:

důkladně omýt postižené místo vodou a mýdlem.

Při nadýchání prachu:

přerušit práci s nástrahou opustit zamořený prostor, nepohybovat se.

Postiženého vždy předat k lékařskému ošetření s informací o poskytnuté první pomoci. **ANTIDOTEM** proti působení brodifacoumu je vitamin **K1-KANAVIT**: Jeho dávku určí lékař. Léčbu postiženého je možné konzultovat s:

Toxikologickým informačním střediskem:

Klinika pracovního lékařství

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Telefon: 224 919 293, 224 915 402

E-mail: ts@vfm.cz

NORAT G je povolen pod číslem CZ-2014-0010, HEM 381-24-2.00/8197. Pro použití v potravinářském průmyslu je schválen ÚSKVBL pod č. 1/04 ze dne 9.1.2004.

DODAVATEL:

PelGar s.r.o.

Na Výsluní 7/2424,
100 00 Praha 10

Tel.: 274 770 944, 608 923 215,

274 770 063, 602 219 959

Fax: 274 770 944, 274 783 078

E-mail: info@pelgar.cz

www.pelgar.cz



s.r.o.

Pro PelGar s.r.o. vyrábí a balí:

AGROCHEMA družstvo STUDENEČ

675 02 Koněšín, okres Třebíč



Norat je v ČR registrovanou ochrannou
známkou TransChem s.r.o., ČR

NORAT G

Obsah: 50 g

Účinná látka: 50 mg brodifacoumu v 1 kg přípravku

Přípravek obsahuje atraktivní nástrahový materiál včetně hořkého činidla, které působí jako chuťový odpuzovač pro člověka a zvířata.

Rodenticidní přípravek – granulovaná nástraha růžové barvy k jednorázovému hubení potkanů, krys a myši domácí a jiných drobných hlodavců v uzavřených objektech (bytové jednotky, chaty, kolny, sklepy, půdy aj.) a v jejich těsné blízkosti

**Obsahuje vysoce toxický antikoagulant brodifacoum!
Ohrožuje zdraví při požití a styku s pokožkou a sliznicemi.**

Toxický pro živočichy a ptáky!

Zákaz používání přípravku ve volné přírodě!

Přípravek používejte pouze podle návodu k použití!

- S1/2** Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.
- S13** Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
- S20/21** Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
- S24** Zabraňte kontaktu s pokožkou.
- S35** Používejte vhodné rukavice.
- S7/47** Uchovávejte obal těsně uzavřený při teplotě +5° až 40°C.
- S36/37/39** Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
- S46** Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
- S49** Uchovávejte pouze v původním obalu.
- S61** Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Biocidní přípravek podle §10 zákona č. 120/2002 Sb.

PŘÍPRAVEK NENÍ KLASIFIKOVÁN A NENÍ NEBEZPEČNÝ PRO PŘEPRAVU

Norat G

Návod na použití:

Nástrahy se vykládají na místa největšího výskytu hlodavců do děr, nor a skrýší podél stězek a jiná místa nejvíce navštěvovaná hlodavci. Mimo takto přirozeně chráněná místa se musí používat jedové stanicky (např. uzavřené bedničky s vhodnými otvory, drenážní trubky apod.), do kterých vkládáme granule tak, aby byl zamezen styk nástrahy s neclodovými organismy (zejména děti a domácí zvířata). Zásada je, větší množství malých hromádek nebo větší počet jedových stanicek než naopak. Nástrahy doplňujeme vždy za 8-10 dní, a to tak dlouho, pokud trvá odběr. Po ukončení akce je nutné odstranit zbytky nástrah. Zbytky se zpětně použijí ke kladení nástrah. Uhynulá zvířata se zakopají na vyhrazeném místě určeném OZP v příslušné lokalitě nebo spálením v kafléřích.

Mechanismus účinku:

Brodifacoum patří mezi antikoagulační jedy. Po požití snižuje srážlivost krve a zvyšuje propustnost krevních cest a zasažený organismus hyne vnitřním krvácením. Na hlodavce působí smrtelně již při jednorázovém požití, ale má i kumulativní účinky. Přípravek je hlodavci velmi dobře přijímán. Úhyn nastává mezi 3-10 dnem po přijetí letální dávky a protože nástraha nevaruje, bylo by častější vykládání nástrah plýtváním.

Dávkování:

Potkani, krysy:

20-60 g granulí na několik míst

ve vzdálenosti 10 m,

při velkém výskytu 5 m.

Myš domácí

5-20 g granulí na několik míst

ve vzdálenosti 5 m,

při velkém výskytu 2 m.

Skladování:

V původních neporušených obalech na bezpečném místě odděleně od potravin krmiv, hnojiv a různých aromatických, látek včetně pesticidů, aby nástrahy nepřejaly zápach, čímž by mohly ztratit svoji atraktivitu pro hlodavce.

Doba použitelnosti / expirace:

3 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování.

Číslo výrobní šarže : uvedeno na krabičce

Datum výroby : uvedeno na krabičce