

VOSKOVANÉ GRANULE PRO HUBENÍ ŠKODLIVÝCH HLODAVCŮ JEDNORÁZOVÝM PŘÍJMEM UVNITŘ A VNĚ OBJEKTŮ ZA ÚČELEM OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A USKLADNĚNÝCH PRODUKTŮ A MATERIÁLŮ. ATRAKTIVNÍ SLOŽENÍ ZEJMÉNA PRO MYŠI V MÍSTECH SKLADOVÁNÍ ZELENINY, OVOCE APOD.

Účinná látka: 0,0025% brodifacoum (25 miligramů v 1 kg přípravku)

Složení: 0,001% denatonium benzoát (hořké činidlo)
30,00% parafin (vosk)
69,9965% atraktivní nástrahový materiál (obilí, sušená mrkev, cukr a další pojiva a atraktanty).

Přípravek obsahuje hořké činidlo zmírňující riziko nežádoucího požití člověkem. Parafinový obal zaručuje delší trvanlivost nástrahy ve vlhkých podmínkách.

Varování:

Může způsobit poškození krevní srážlivosti při prodloužené nebo opakované expozici. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

- Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.
- Skladujte v uzavřeném obalu. Skladujte uzamčené.
- Používejte ochranné rukavice.
- Zamezte styk s očima, kůží nebo oděvem.
- Při používání tohoto přípravku nejezte, nepijte a nekuřte.
- Při požití: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko.
- Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- Odstraňte obsah/obal oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Přípravek obsahuje vysoce toxický antikoagulant brodifacoum. Škodlivý pro domácí a hospodářská zvířata (zejména psy, kočky, prasata a drůbež), ale i ptáky a volně žijící zvířata. Je nutné zabránit přístupu zvířat k nástraze, která musí být zajištěna proti jejímu odtážení mimo místa aplikace.

Deratizační staničky musí být odolné vůči neoprávněnému otevření a označeny nápisem, že obsahují látku k hubení hlodavců.

Přípravek nepoužívejte v místech, kde se manipuluje s potravinami či krmivy, kuchyňským náčiním apod. a může tak dojít ke kontaminaci.

Přípravek nesmí být použit jinak než jak uvedeno v návodu na použití.

Mechanismus účinku:

Brodifacoum patří mezi antikoagulační jedy. Po požití snižuje srážlivost krve a zvyšuje propustnost krevních cest a zasažený organismus hyne vnitřním vykrvácením. Na hlodavce působí smrtelně již při jednorázovém požití, ale má i kumulativní účinky.

Návod na použití:

Profesionální uživatelé:

Aplikace je povolena do komerčně dostupných deratizačních staniček (předem naplněných či znovu doplnitelných). Staničky se nesmí umísťovat v místech, kde hrozí záplavy.

Kontrola staniček se provádí každé 2 až 3 dny v počáteční fázi deratizace, poté nejméně jednou týdně, za účelem zjištění odběru nástrah, odstranění uhybnulých hlodavců a poškozených staniček. V případě nutnosti doplnit nástrahu a odstranit ty staničky, které byly poškozeny nebo kontaminovány nečistotami.

Při použití vně budov je nutné chránit nástrahu před povětrnostními podmínkami (děšť, sníh apod.)

Odborně způsobilé osoby:

Pro venkovní použití (plošné deratizaci) musí být nástraha bezpečně umístěna tak, aby se minimalizoval kontakt a nebezpečí požití nástrahy dětmi či zvířaty. Při použití nástrah přímo v norách je nutné řádně zakrýt jejich vchody. V počáteční fázi nahraďte zkonsumovanou nástrahu po 2-3 dnech a pak maximálně v sedmidenních intervalech. Vždy je nutné posbírat rozsypanou nástrahu a uhybnulé hlodavce. Na konci deratizační akce odstraňte všechny zbytky přípravku. Přípravek nesmí být použit jako stálá nástraha k prevenci zamoření hlodavci nebo sledování jejich aktivit.

Další pokyny a postupy při použití přípravku naleznete v příbalovém letáčku uvnitř souboru.

Upozornění:

Při zacházení s nástrahou jsou nutné rukavice, i vzhledem na pachové stopy, které by mohly hlodavce odrazovat (viz kapitola skladování).

Dávkování:

Myš domácí (dospělec): 5 - 20 g
Potkan obecný (dospělec): 10 - 60 g

Biocidní přípravek podle §5 zákona č. 324/2016 Sb. pro profesionály a osoby odborně způsobilé.

NORAT ATG

profi

10 kg



VOSKOVANÁ RODENTICIDNÍ NÁSTRAHA

Bezpečnostní opatření:

Při práci s rodenticidem NORAT ATG není dovoleno jíst, pít a kouřit. Během práce je nutno používat osobní, ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, gumové rukavice a kožené nebo gumové boty). Po práci a při každém přerušení práce je nutno si omýt ruce vodou a mýdlem.

Příznaky otravy a první pomoc:

Krátkce po požití nevolnost, zvracení. Po několika hodinách až dnech krvácení do pokožky a sliznic, tvorba modřin, močení krve, krvavá stolice, krvácení z nosu a dásní.

První pomoc:

Při náhodném požití: Vypláchněte ústa čistou vodou. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledat lékařské ošetření.

Při zasažení očí: Udržte víčka otevřená a vymývat oči proudem čisté vody po dobu 5-10 minut a vyhledat lékařské ošetření.

Při zasažení pokožky: Svlékněte kontaminovaný oděv a důkladně omývejte zasažené místo vodou a mýdlem.

Při nadýchání prachu: přerušit práci s nástrahou, opustit zamořený prostor, nepohybovat se.

Postiženého vždy předat k lékařskému ošetření s informací o poskytnuté první pomoci. anti-
dotem proti působení brodifacoumu je vitamin K1. Jeho dávkou určí lékař nebo veterinář. Léčbu
postiženého je možné konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem:

Klinika pracovního lékařství
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK
Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
Telefon: 224 91 92 93, 224 91 54 02 nepřetržitě

Skladování přípravku:

NORAT ATG se skladuje na bezpečném místě v původních obalech, v uzamykatelných skladiš-
tích odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek,
od aromatických látek, zejména pesticidů. Pro skladování nelze použít ani místnosti, kde byly
pesticidy dříve skladovány. Přejatý zápach by mohl působit repelentně na hlodavce. Chraňte
nástrahu před přímým slunečním světlem a vlhkem. Skladujte v suchu a dobře větratelném
místě a při teplotě +5°C až +35°C.

Přípravek je hořlavý. Eventuální požár se likviduje hasební pěnou, práškem, eventuálně pískem
nebo zeminou. Nesmí být použita voda, s výjimkou jemného zmlžování pro ochlazení materi-
álu v blízkosti požáru a pouze za předpokladu, že je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná
hasební voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména, aby nemohla pro-
niknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla
zasáhnout zemědělskou půdu.

Důležité upozornění:

Při požáru musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku
toxických látek nebo zplodin.

Likvidace obalů:

Prázdne plastové soubky a polyethylenové sáčky (po důkladném vyklepání) lze likvidovat
v komunálním odpadu.

Doba použitelnosti:

minimálně 2 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování.

Dodavatel:

PelGar s.r.o.
Na Výsluní 7/2424, 100 00 Praha 10
Telefon: 608 923 215, 602 219 959
274 770 944

E-mail: info@pelgar.cz
www.pelgar.cz

Výrobce:

Pro PelGar s.r.o. vyrábí a přebaluje
AGROCHEMA, družstvo
675 02 Studenec



S.r.o.

Hmotnost: 10 kg



Číslo výrobní šarže: uvedeno na obalu
Datum výroby: uvedeno na obalu



Bezpečnostní list k přípravku je k dispozici u dodavatele, výrobce nebo na www.pelgar.cz

**NORAT ATG je povolen MZDR čj. CZ 2015-0009
Spisová značka 37346/2017/SOZ**

NORAT je registrovanou ochrannou známkou PelGar International Ltd. Velká Británie.