

Účinná látka: 400g cypermethrinu v 1 kg přípravku

Cyrol Forte lze použít v zemědělských a potravinářských provozovnách a výrobnách, v restauracích, skladech, veřejných budovách, jatkách, skládkách, domácnostech aj. Vyznačuje se rychlým účinkem (knockdown) a dlouhodobou reziduální účinností při použití nízkých aplikačních dávek. Působí dotykově a požerově, zejména proti žravým škůdcům.

NEBEZPEČÍ



Zdraví škodlivý při požití.

Způsobuje vážné poškození očí.

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Může způsobit poškození orgánů (nervový systém) při prodloužené nebo opakované expozici.

Vysoce toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.

Obsahuje disodium maleate. Může vyvolat alergickou reakci.

POKyny PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

Necíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko/lékaře.

Používejte ochranný oděv, brýle, obličejový štít, ochranné rukavice.

Při používání tohoto přípravku nejzte, nepijte ani nekurte.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

DÁVKOVÁNÍ:

Lezoucí a odpočívající létající hmyz:

Slabé zamoření: 10 g na 5 litrů vody a 100 m² plochy.

Silné zamoření: 20 g na 5 litrů vody a 100 m² plochy.

1 litr postřikové jichy vystačí na 20 m² plochy. Aplikaci uvnitř objektu lze provést 1-2x měsíčně, venkovně 1-2x ročně (max. venkovní ošetřená plocha je 5m²).

NÁVOD NA POUŽITÍ:

Štěnice:

před aplikací dokonale vysát celý zamořený prostor. Přípravek se aplikuje do míst, odkud se štěnice šíří, z okrajů jejich šíření do středu výskytu. Štěnice vypuzené z úkrytů se mohou pohybovat na ošetřených plochách a vzájemně se kontaminovat. Nutný je postřík do všech škvír, trhlin, mezer, puklin, rámu a čela postelí, veškerého nábytku, závěsů, koberců, podlahy, dřevěného obložení apod. Lůžkoviny, povlaky, záclony vyprat v horké vodě. Před spaním položit na postele nový/zcela čistý chránič matrací.

Švábi, rybenky:

aplikujte do míst, kde se hmyz pohybuje (okolí vodních trubek, okenních rámu, dveří, chladniček, zásuvek, ventilačního potrubí, škvír stěn atd.)

Mravenci:

postříkat všechna místa výskytu vč. přístupových cestiček.

Brouci (pilous, potemník):

aplikace v prázdných skladističních prostorách.

Blechy:

před aplikací důkladně vyluxovat místa výskytu. Postříkat všechna místa, kde se zvířata pohybují, vč. spodních stran koberců, pelišků atd.

Mouchy, vosy, komáři:

aplikujte přípravek na vstupní branky hnízd a povrchy, kam létající hmyz usedá.

PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY:

Postřikovač se naplní do poloviny vodou, nechá se rozpustit odměřená dávka přípravku, což trvá 2-3 minuty. Po té se dodá zbývající objem vody a roztok řádně promíchá. Každá postřiková kapalina, která zůstane po přerušení aplikace v postřikovači, musí být opět velmi dobře promíchána, pod dobu nejméně 30 sekund. Předchozí dokonalá mechanická očista a příprava asanovaného objektu (např. vybičení) zvyšuje reziduální účinky na škůdce. Provozní nebo klimatické podmínky mají podstatný vliv na perzistenci přípravku. Použijte kompresní postřikovač (čistý, bez olejových nečistot) o velikosti síta ne jemnějším než 50 ok.

CYTROL FORTE

250 g

INSEKTICIDNÍ PRÁŠEK



obrázky
© Josef Dvořák

Biocidní přípravek pro profesionální použití

UPOZORNĚNÍ:

Neaplikujte na místa, kde jsou uskladněny potraviny

a krmiva a kde se s nimi manipuluje.

Znovu nepoužívat prázdný obal.

Zabraňte přístupu kočkám a dalším domácím mazlíčkům na ošetřená místa.

Nepoužívejte na zvířata!

Nestříkat na čisté vodní plochy (akvária, jezírka apod.)

Nestříkat blízko elektrických spotřebičů, světelných zařízení nebo vypínačů.

OCHRANNÁ LHŮTA:

Vstup na ošetřená místa po úplném zaschnutí přípravku, což trvá méně než hodinu.

PRVNÍ POMOC:

Při požití:

Vypláchněte důkladně ústa (vodou). **Nevyvolávejte zvracení.**

Okamžitě volejte TIS.

Při styku s kůží:

Po manipulaci důkladně omyjte zasaženou kůží. Při podráždění kůže nebo vyrážce, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při dýchacích potížích:

Postiženého dopravit na čerstvý vzduch, popř. volejte lékaře.

Při zasažení očí:

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování po dobu nejméně 15 minut. Nemněte si oči. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Léčbu postiženého lze konzultovat s TIS:

Toxikologické informační středisko,

Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

Telefon: 224 91 92 93, 224 91 54 02 nepřetržitě

tis@vfm.cz / www.tis-cz.cz

CYTROL FORTE byl oznámen na MZ pod čj. 39171/2009 - SOZ - 33.5 - 27. 8. 2009

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte přípravek uzamčený, v originálním neporušeném obalu, při teplotě od +5°C až +30°C, odděleně od potravin, krmiv, dezinfekčních prostředků. Chráňte před přímým slunečním světlem a mrazem.

DODAVATEL:

PelGar s.r.o.

Na Výsluní 7/2424, 100 00 Praha 10

Tel.: 274 770 944, 608 923 215, 602 219 959

info@pelgar.cz / www.pelgar.cz

VÝROBCE:

PelGar International Ltd.

Unit 13, Newman Lane

Industrial Estate Alton

Hampshire GU34 2 QR, Velká Británie

www.pelgar.co.uk

DATUM VÝROBY / EXPIRACE

ČÍSLO VÝROBNÍ ŠARŽE:

uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: minimálně 2 roky při předepsaném způsobu skladování.

UFI G090-104X-T00M-VDR7

Cyrol Forte lze použít v potravinářských provozech na základě vyjádření ÚSKVBL pod číslem 83/2009 ze dne 2. 10. 2009

Bezpečnostní list je k dispozici na www.pelgar.cz nebo u dodavatele.

CYTROL je registrovanou obchodní známkou firmy PelGar International Ltd., Velká Británie.



International

